




PŘÍPRAVA NA SEZÓNU KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY: NA PREVENCI MYSLETE VČAS

Klíšťová encefalitida je nejzávažnějším onemocněním přenášeným u nás klíšťaty. Postihuje centrální i periferní nervový systém, s rizikem trvalých následků. Závažnost průběhu onemocnění a následků **stoupá s věkem**.

Počty případů klíšťové encefalidity v Jihomoravském kraji v letech 2012-2023:



Souhrn období 2018-2023 v ČR: počty případů v krajích celkem a dle věku a pohlaví:



Prevence:

Očkování proti klíšťové encefalitidě bylo v ČR zahájeno již v roce 1990. **Přesto není využíváno dostatečně a počet případů tak neubývá. Jedná se o zbytečná onemocnění, kterým bylo možné včas předejít.**

Závažnost onemocnění a riziko trvalých následků souvisí zejména s **vyšším věkem**. Toto zohledňují zdravotní pojišťovny, které **od roku 2022 osobám starším 50 let očkování hradí**. Ostatním na očkování přispívají formou benefitů. Očkování provádějí praktičtí lékaři a lékaři očkovacích center.

Ochranná imunita proti onemocnění vzniká po 2. dávce očkování, která je podána v odstupu 1-3 měsíců po podání 1. dávky nebo ve zkráceném schématu v odstupu 14 dnů. Pro prevenci je proto klíčové **zahájit očkování včas**.

MUDr. Renata Ciupek, protiepidemický odbor KHS Jihomoravského kraje
Brno, 17.04.2024