

Chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací - NV č. 506/2021 Sb.

TABULKA KRITÉRIÍ PRO UZNÁNÍ NEMOCI Z POVOLÁNÍ

| | | |
|---------------------|-----------------------|---|
| Předběžná kritéria | I | Diagnóza chronického onemocnění bederní páteře Dg dle MKN: M 51.1-3, M 51.9, M 54.1, M 54.3-5 (byla provedena dif. dg.) |
| | II | Dočasná pracovní neschopnost pro výše uvedené dg v celkové době trvání alespoň 12 měsíců během posledních 3 let, buď před ukončením pracovního poměru nebo před prvním posouzením ve Středisku nemocí z povolání (NzP) u pracovníků, kteří v pracovním poměru jsou |
| | III | Těžká fyzická práce nejméně poslední 3 roky před zjištěním nemoci. Započítává se délka potenciálně rizikové práce* před první splňující magnetickou rezonancí (MR), která byla provedena buď v době trvání pracovního procesu nebo až po skončení potenciálně rizikové práce, nejdéle však do 1 roku <i>* Potenciálně riziková práce je taková, při které se jako pravidelná součást výkonu práce vyskytuje alespoň jeden z těchto úkonů: práce v nefyziologických pracovních polohách (předklon, úklon), úkony spojené s manipulací s břemeny nebo úkony, při nichž dochází k tlačným či tažným silám v horizontálním či vertikálním směru.</i> |
| Klinická kritéria | Radiologická kritéria | IV Odpovídající tíže postižení při radiologickém vyšetření (MR/popř. CT) Hodnotí se změny ve 3 segmentech L3/4, L4/5 a L5/S1 vždy v 5 parametrech; za požadovanou tíži se považuje abnormalita u osoby ve věku do 50 let celkem alespoň v 5 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 6 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 7 parametrech 1. snížení meziobratlové ploténky minimálně o 1/3 2. protruze meziobratlové ploténky minimálně o 3 mm 3. změny struktury obratlových těl odpovídající Modic II-III, nebo výrazné změny struktury obratlových těl na CT 4. posun obratlového těla minimálně o 4 mm 5. artróza meziobratlových kloubů |
| | Neurologická kritéria | V Odpovídající tíže postižení při klinickém neurologickém vyšetření Hodnotí se 7 parametrů, za požadovanou tíži se považuje abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň ve 4 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 5 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 6 parametrech 1. palpační bolestivost v lumbálním segmentu 2. Thomayerův příznak 3. Lasègueův příznak 4. alterace reflexů L2/4 nebo L5/S2 5. motorický deficit v příslušném myotomu 6. sensitivní deficit v příslušném dermatomu 7. EMG průkaz axonální léze v příslušném nervovém kořenu |
| Hygienická kritéria | VI | Jedná se o těžkou fyzickou práci, při které jsou příslušné struktury dlouhodobě přetěžovány natolik, že přetěžování je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci, tj. jestliže při této práci vykonávané nejméně 3 roky alespoň 60 směn ročně kompresní tlak na ploténku L4/L5 překračoval hodnoty vycházející z limitu NIOSH US 3400 N a zohledňující relevantní antropometrické znaky osoby a ergonomické, časové a frekvenční parametry práce. |

Zásada: musí být splněna VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ KRITÉRIA současně, pokud jedno z nich není splněno, o nemoc z povolání se nejedná.