

Výsledky pozorování za období červenec 2025

Lokalita	Datum	Situace na lokalitě	Výskyt komárů	Stupeň nebezpečí
BŘECLAVSKO				
<i>Horní les, Kančí obora</i>	2. 7.	Tůně jsou vyschlé.	V Kančí oboře mezi Břeclaví a Lednicí je aktivita poněkud nižší, než je v tomto období obvyklé a pozvolna klesá. V rezervaci Křivé jezero je aktivita poněkud vyšší, ale ani zde nepřekračuje obvyklou úroveň. Dominantními druhy jsou <i>Aedes sticticus</i> a <i>Ae. vexans</i> . V celé oblasti se v případě delšího pobytu a nižší pohybové aktivity doporučuje použití repelentních přípravků.	+
<i>Lednické rybníky</i>	2.7.	Hladina Mlýnského rybníka je poměrně vysoká	Na březích rybníků byl zjištěn zvýšený výskyt komárů. Dominantním druhem je <i>Culex modestus</i> . Tento druh se zdržuje jev v bezprostřední blízkosti rybníků a člověka napadá, především v pozdních odpoledních hodinách. V oblasti v blízkosti lesa je pravděpodobné zalétávání komárů z této oblasti (viz Kančí obora). Při delším pobytu je vhodné použít vhodný repelent.	++
<i>Polesí Lanžhot</i>	2. 7	V oblasti se neobvyklé sucho, nacházejí se zde jen izolované periodické tůně, ve kterých jsou obvykle zbytky starší voda.	Aktivita komárů je v celé oblasti nižší, než je v tomto období obvyklé, v blízkosti zámečku Pohansko velmi nízká. Dominantním druhem je <i>Aedes vexans</i> . Na mnoha místech, především v blízkosti zámečku Pohansko je zvýšený výskyt muchniček, které jsou aktivní především ve dne. Při delším pobytu se doporučuje použít repelenty.	+
<i>Polesí Tvrdonice</i>	2. 7.	V polesí Tvrdonice jsou periodické tůně vesměs vyschlé.	Aktivita samic komárů je zatím spíše podprůměrná. Dominantní druhem je <i>Aedes sticticus</i> .	+
HODONÍNSKO				
<i>Hodonín - Loděnice</i>	2. 7.	Periodické tůně jsou vyschlé.	Aktivita komárů je přes den nízká.	+
CELÉ ÚZEMÍ		Aktivita komárů dosáhla vrcholu a lokálně může být zvýšená. Nikde však nepřekračuje úroveň pro tuto oblast obvyklou. Na zahradách je třeba věnovat zvýšenou pozornost nádobám s dešťovou vodou a bazénům, kde často dochází k masívnímu vývoji komárů. Pokud se zde larvy objeví, je nutné vodu vylít, nebo urychleně použít. Barely je dobré rovněž zakrývat.	Pokud nenastanou výrazné srážky, pak se v následujícím období nebude příliš měnit a bude závislá na vývoji počasí. Dominantními druhy jsou <i>Aedes sticticus</i> a <i>Aedes vexans</i> . Jedná se o druhy, který člověka intenzivně napadají, zvláště za vlhkého počasí a jsou aktivní především ve dne. V blízkosti zahrádkářských kolonií je třeba počítat se zvýšeným výskytem komára pisklavého (<i>Culex pipiens</i>), který se vyvíjí v barelech s vodou a bazénech. Tento komár je aktivní především v době kolem západu slunce a večer a často zaletuje do bytů. Na člověku saje zřídka, ale svými projevy obtěžuje.	++

RNDr. Oldřich Šebesta, protiepidemický odbor

Výsvětlivky:

0 nebyl zjištěn výskyt žádný, nebo jen zanedbatelný
+ vzhledem četnosti výskytu, rozsahu záplav, lokalizaci a druhovému složení nehrozí bezprostřední nebezpečí
++ nebezpečí lokálního zvýšení výskytu, nutná zvýšená pozornost
+++ bezprostřední nebezpečí zvýšeného výskytu, doporučeno provést opatření k snížení dopadu na obyvatelstvo
kalamita bezprostřední ohrožení obyvatelstva, nutná opatření pro snížení dopadu na obyvatelstvo