

# KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA STÁLE AKTUÁLNÍ


## NEPODCEŇUJTE PREVENCI

Jihomoravský kraj patří k regionům s vyšším rizikem nákazy virem klíšťové encefalitidy. Jedná se o přírodní lokality a rekreační oblasti, ale i městské parky. Pro onemocnění je charakteristická **sezónnost související s aktivitou klíšťat**. Klíšťata jsou aktivní od jara, zpravidla až do pozdního podzimu.

**Od začátku letošní sezóny do 30. září 2024 byl v Jihomoravském kraji hlášen stejný počet případů, jako za celý loňský rok. Aktuální houbařská sezóna a příznivé počasí aktivitě klíšťat přeje a riziko nákazy stoupá.**

### Počty případů klíšťové encefalitidy v Jihomoravském kraji (2015-2024)

počty za rok 2024 jsou pouze k 30.09.2024



Klíšťová encefalitida je onemocnění často podceňované, přitom je u nás nejzávažnějším onemocněním přenášeným klíšťaty. Postihuje centrální i periferní nervový systém. **Závažnost průběhu onemocnění a riziko trvalých následků stoupá s věkem.**

### Prevence:

Jedinou účinnou prevencí je očkování. Závažnost onemocnění pro osoby nad 50 let věku zohledňují zdravotní pojišťovny, které **osobám starším 50 let očkování plně hradí.**

Ostatním osobám na očkování přispívají formou benefitů. Očkuje se i v sezóně, za použití **zrychleného schématu.**

**K plné ochraně je potřeba dodržet základní očkovací schéma a pravidelné přeočkování.**

*MUDr. Renata Ciupek, protiepidemický odbor KHS Jihomoravského kraje  
Brno, 06.10.2024*